

**Auszug
Methodenliste**

Primär- antikörper	VDR Klassifizierung	Bestimmungszweck (zum Nachweis von)
Actin	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer Actin-Expression in glattmuskulären Zellen, Myofibroblasten und myoepithelialen Zellen bzw. entsprechend assoziierten Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
AFP	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer AFP-Expression in u.a. Keimzelltumoren, hepatozellulären Entitäten oder hepatoid differenzierten Läsionen in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Androgen	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer nukleären AR-Expression in Epithelzellen bzw. apokrin/sebaziös differenzierten Entitäten in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
ALK	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von ALK-translozierten Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
bcl2	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer Expression einer bcl-2-Expression in lymphatischen Neoplasien, epithelialen und mesenchymalen Läsionen in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
bcl6	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer Expression des bcl-6-Proteins in lymphatischen Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
β-Catenin	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer nukleären/zytoplasmatischen β-Cateninexpression zur Differenzierung neoplastischer Läsionen in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.

**Auszug
Methodenliste**

Primär- antikörper	IVDR Klassifizierung	Bestimmungszweck (zum Nachweis von)
Calcitonin	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von Calcitonin-Molekülen in C-Zellen bzw. medullären Schilddrüsenkarzinomen in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Caldesmon	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von Caldesmon-Molekülen in glattem Muskelzellgewebe in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Calretinin	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer Calretinin-Expression in normalen und neoplastischen Mesothelzellen, zur Differenzierung ovarieller/testikulärer sowie adrenokortikaler Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
CD 3 (T-zell)	CIV	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CD3-Expression in T-Zellen und assoziierten hämatologischen Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
CD 4	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CD4-Expression in T-Zellen bzw. assoziierten hämatologischen Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
CD 5	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CD5-Expression in T-Zellen bzw. assoziierten hämatologischen Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
CD 8	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CD8-Expression in T-Zellsubpopulationen bzw. assoziierten hämatologischen Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.

**Auszug
Methodenliste**

Primär- antikörper	IVDR Klassifizierung	Bestimmungszweck (zum Nachweis von)
CD 10	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CD10-Expression zur Differenzierung hämatologischer/epithelialer und mesenchymaler Läsionen/Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
CD 15	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CD15-Expression in hämatologischen Neoplasien (u.a. Hodgkin-Zellen bzw. Reed-Sternberg-Zellen) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
CD 20 (B-zell)	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CD20-Expression in B-Zellen/B-Zellneoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
CD 23	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CD23-Expression in follikulären dendritischen Zellen und B Zellen (Subpopulation) bzw. entsprechend assoziierten Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
CD 30	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CD30-Expression in anaplastischen großzelligen Lymphomen (ALCL), Hodgkin- bzw. Reed-Sternberg-Zellen, aktivierten T- und B-Zellformen sowie zur näheren Differenzierung epithelialer Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
CD 33	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CD33-Expression in hämatologischen/myeloischen Zellen sowie Monozyten/Makrophagen bzw. assoziierten hämatologischen Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
CD 34	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CD34-Expression in Endothelien und vaskulären Läsionen/Neoplasien sowie zur Subtypisierung hämatologischer sowie epithelialer/mesenchymaler Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.

**Auszug
Methodenliste**

Primär- antikörper	IVDR Klassifizierung	Bestimmungszweck (zum Nachweis von)
CD 56	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CD56-Expression in Zellen/Neoplasien neuroektodermalen Ursprungs sowie NK-Zellen/NK-Zellneoplasien bzw. Plasmazellneoplasien wie auch epithelialer/mesenchymaler Entitäten in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
CD 61	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CD71-Expression in erythroiden Zellen/erythroid differenzierten hämatologischen Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
CD 68	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CD68-Expression in histiozytären/monozytären Zellen/Neoplasien sowie zur Typisierung mesenchymaler Läsionen/Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
CD 71	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CD71-Expression in erythroiden Zellen/erythroid differenzierten hämatologischen Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
CD 79a	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CD79a-Expression in B-Zellformen bzw. assoziierten hämatologischen Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
CD 99	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CD99-Expression in Ewing-Sarkomen/peripheren neuroektodermalen Tumoren sowie zur Typisierung epithelialer/mesenchymaler und hämatologischer Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
CD 117 KM	CIII	Nachweis einer CD117-Expression in hämatopoetischen Stammzellen, Melanozyten, Mastzellen, Cajalzellen, Keimzellen, Basalzellen und mammären ductalen Epithelen sowie entsprechend assoziierten Läsionen/Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen

**Auszug
Methodenliste**

Primär- antikörper	IVDR Klassifizierung	Bestimmungszweck (zum Nachweis von)
CD 138	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CD138-Expression in Plasmazellen/plasmazellulären Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
CDX-2	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CDX2-Expression in (nicht)neoplastischen Epithelien gastrointestinalen Ursprungs bzw. gastrointestinaler Differenzierung in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
CEA	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CEA-Expression in (nicht)neoplastischen Epithelien gastrointestinalen Ursprungs bzw. gastrointestinaler Differenzierung sowie zum Nachweis einer ductalen Differenzierung in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
c-erb	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer Her2/neu-Expression in neoplastischen Zellen (u.a. Mamma, Magen, Colon) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Chromogranin	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer Chromogranin-Expression in neuronalen und endokrinen Zellen in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
CK 5/14	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis (nicht) neoplastischer Epithelien mit plattenepithelialer Differenzierung bzw. von Basalzellen in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
CK 7	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CK7-Expression in glandulären und transitionalen Epithelien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
CK 8/18	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer Keratinexpression in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.

**Auszug
Methodenliste**

Primär- antikörper	IVDR Klassifizierung	Bestimmungszweck (zum Nachweis von)
CK 20	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CK20-Expression in (nicht)neoplastischen gastrointestinalen Epithelien, Urothelien und Merkel-Zellen in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Claudin 18	CIII	Qualitative und quantitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CK20-Expression in (nicht)neoplastischen gastrointestinalen Epithelien, Urothelien und Merkel-Zellen in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
CMV	CIV	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von CMV-infizierten Zellen in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
COL IV	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer Collagen IV-Expression in Basalmembranen in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Cyclin D1	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer CyclinD1-Expression in Endothelzellen, lymphatischen Neoplasien (u.a. Mantelzell-Lymphom, Haarzellleukämie) und Plasmazellneoplasien sowie zur Subtypisierung von Tumorentitäten in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Desmin	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer Desmin-Expression in glattmuskulären und quergestreiften sowie kardialen (nicht)neoplastischen Zellen sowie zur Typisierung von Tumorentitäten in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
DOG1	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer DOG1-Expression in gastrointestinalen Stromatumoren, Cajal Zellen sowie zur Typisierung von Tumorentitäten in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
EGFR	CIV	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer EGFR-Expression in bestimmten epithelialen Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.

**Auszug
Methodenliste**

Primär- antikörper	IVDR Klassifizierung	Bestimmungszweck (zum Nachweis von)
E-Cadherin	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis eines E-Cadherin-Expressionsverlustes in lobulären Neoplasien der Brust und nukleärer Expression in soliden-pseudopapillären Neoplasien des Pankreas sowie E-Cadherin-Expression in Epithelien sowie hämatologischen Vorläuferzellen in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
EMA	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer EMA-Expression in (nicht)neoplastischen Epithelien sowie zur Typisierung von Tumorentitäten in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
ERG	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer ERG-Expression in Endothelien, vaskulären Läsionen sowie zur Typisierung von Tumorentitäten in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
GATA-3	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer nukleären GATA3-Expression in (nicht)neoplastischen Epithelien, Urothelien und T-Lymphozyten sowie zur Typisierung von Tumorentitäten in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
GFAP	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer GFAP-Expression in Zellen astrozytären/glialen Ursprungs und assoziierten Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Glypican	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer Glypican3-Expression in (nicht)neoplastischen hepatozellulären Zellen sowie zur Typisierung in urogenitalen/gynäkologischen Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
GST	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von GST-Expressionsmustern in der Differentialdiagnose hepatischer Läsionen/Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.

**Auszug
Methodenliste**

Primär- antikörper	IVDR Klassifizierung	Bestimmungszweck (zum Nachweis von)
hCG	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer hCG-Expression in (nicht)neoplastischen trophoblastären Zellen bzw. Zellelementen in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
HEA / Ber EP4	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis epithelialen Zellen nicht mesothelialen Ursprungs in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Hepatocyte	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer Hepar-Expression in hepatozellulär bzw. hepatoid differenzierten Zellen/Neoplasien sowie intestinal differenzierter Mucosa und assoziierten Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
HSV (Herpes)	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von HSV in infizierten Zellen in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
HMB45	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer HMB45-Expression in melanozytären Zellen/Neoplasien sowie perivaskulären epitheloiden Zelltumoren (u.a. Angiomyolipom/PeCOM) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
HP	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von HLO (Helicobacter like organisms), speziell im Magen, in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
IgG	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von IgG-positiven Zellen in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
IgG4	CIII	Qualitative und quantitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von IgG4-positiven Plasmazellen in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.

**Auszug
Methodenliste**

Primär- antikörper	IVDR Klassifizierung	Bestimmungszweck (zum Nachweis von)
Inhibin alpha	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von Inhibin α -positiven Zellen (z. B. Keimstrang-Stroma-Tumoren) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Kappa	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer Kappa-Leichtkettenexpression, speziell in Plasmazellen, in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Keratin (Cytok.)	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer Keratinexpression in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Lambda	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von Lambda-Leichtkettenexpression, speziell in Plasmazellen, in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
LCA	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von Zellen mit hämatolymphoider Differenzierung bzw. assoziierten hämatologischen Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose
MDM2	CIV	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer MDM2-Expression (z.B. bei Liposarkomen) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Melan A	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer MelanA (MART1)-Expression (z.B. bei melanozytären Läsionen) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
MIB	CIII	Quantitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zur Bestimmung der Proliferation von Tumoren (z. B. Mammakarzinom, NET,...) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.

**Auszug
Methodenliste**

Primär- antikörper	IVDR Klassifizierung	Bestimmungszweck (zum Nachweis von)
MLH 1	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zur Analyse des MLH-1-Status (z. B. bei Kolonkarzinomen, Magenkarzinomen, etc.) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
MPO	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von Myeloperoxidase-positiven Zellen (z. B. bei der Analyse von Knochenmark, speziell hämatologischer Neoplasien) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
MSH 2	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis der Expression des DNA-Reparaturenzyms MSH2 (z. B. bei Kolonkarzinom) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
MSH 6	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis der Expression des DNA-Reparaturenzyms MSH6 (z. B. bei Kolonkarzinom) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
MSH 6	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis der Expression des DNA-Reparaturenzyms MSH6 (z. B. bei Kolonkarzinom) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
MUM1	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von MUM1-positiven Zellen (z. B. Nachweis von Plasmazellen, z. B. zur Subtypisierung von DLBCL) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Myogenin	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von Myogenin-positiven Zellen (z. B. bei Rhabdomyosarkomen) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Napsin A	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von Napsin-positiven Zellen (z. B. bei Lungenkarzinomen) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.

**Auszug
Methodenliste**

Primär- antikörper	IVDR Klassifizierung	Bestimmungszweck (zum Nachweis von)
Östrogen	CIII	Qualitative und quantitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer Östrogenrezeptor-Expression in (nicht)neoplastischen epithelialen und mesenchymalen Zellen in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Oscar	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer epithelialen Differenzierung (z. B. in undifferenzierten Neoplasien) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
p16	CIII	Qualitative und quantitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von p16-positiven epithelialen Zellen (z. B. gynäkologische (Prä-)Neoplasien der Cervix) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
p40	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von p40-positiver Zellen (z. B. Plattenepithelien) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
p 53	CIII	Qualitative und quantitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis der p53-Expression (z.B. zur Subtypisierung von Endometriumkarzinomen) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
p 63	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von p63-positiven Zellen (z. B. Plattenepithelien, z. B. Basalzellen) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
p504s	CIV	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer p504s-Überexpression in prostatistischen und renalen Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
panTRK	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer Pan-TRK-Expression in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.

**Auszug
Methodenliste**

Primär- antikörper	IVDR Klassifizierung	Bestimmungszweck (zum Nachweis von)
PAX5	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von PAX5-positiven B-Zellen (z. B. bei der Diagnostik lymphatischer Neoplasien) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
PAX8	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von PAX8-positiven Zellen (z. B. bei Endometriumkarzinomen, Nierenzellkarzinomen) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
PD-L1	CIII	Qualitative und quantitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis der PD-L1 Expression in Tumorzellen und tumorassoziierten Immunzellen in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
PLAP	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von PLAP-positiven Zellen (z. B. bei der Diagnostik von Keimzelle Neoplasien) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
PMS 2	CIII	Qualitative und quantitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von der Expression des DNA-Reparaturenzyms PMS2 (z. B. im Rahmen der HNPCC-Diagnostik) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Podoplanin (D2-40)	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von Podoplanin (D2-40)-positiven Epithelien in Lymphgefäßen, Mesotheliomen und Seminomen in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Progesteron	CIII	Qualitative und quantitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer Progesteronrezeptor-Expression in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
PSA	CIV	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zur Untersuchung der Expression des prostata-spezifischen Antigens (PSA) (z. B. zur Frage, ob es sich um neoplastische Zellen eines Prostatakarzinom handelt) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.

**Auszug
Methodenliste**

Primär- antikörper	IVDR Klassifizierung	Bestimmungszweck (zum Nachweis von)
PSAP	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis der Expression der prostataspezifischen sauren Phosphatase (z. B. zur Frage, ob es sich um neoplastische Zellen eines Prostatakarzinom handelt) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
ROS 1 läuft aus	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis ROS1-translozierter Tumorzellen (z. B. in Lungencarcinomen) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
S 100	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von S100-positiven Zellen (z. B. bei malignem Melanom oder Weichgewebstumoren) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Sox10	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von SOX-10-positiven Zellen (z. B. bei der Diagnostik von malignen Melanomen) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Synaptophysin	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von Synaptophysin-exprimierenden Tumorzellen (z. B. beim kleinzelligen Bronchialkarzinom, bei neuroendokrinen Tumoren,...) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
TDT	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis TdT-positiver Zellen bei der Diagnostik lymphatischer/hämatologischer Neoplasien in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Thyreoglobulin	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer Thyreoglobulin-Expression (z. B. zur Diagnostik von Schilddrüsentumoren) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Trypsin	CIV	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer Trypsinexpression bei der Diagnostik von Tumoren (z. B. Pankreastumoren) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.

Auszug
Methodenliste

Primär- antikörper	IVDR Klassifizierung	Bestimmungszweck (zum Nachweis von)
TTF1	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer TTF1-Expression (z. B. bei Lungentumoren oder bei Schilddrüsentumoren) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
Vimentin	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis einer Vimentin-Expression (z. B. in der Weichgewebspathologie) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose oder -stadieneinteilung.
WT1	CIII	Qualitative immunhistochemische Färbung durch unterwiesenes Laborpersonal zum Nachweis von WT1-positiven Zellen (z. B. Mesothel/Mesotheliom, z. B. high grade seröse Ovarcarcinome) in humanem, fixiertem (4 % Formaldehyd, neutral gepuffert) Gewebematerial aller Patientengruppen zur Unterstützung der subjektiven, mikroskopischen Auswertung der Fachärzte im Rahmen der Krebsvorsorge, -diagnose

aktualisiert am:
30.03.2025
durch: MW/La